



แว่นท็อปเจริญ®
TOP CHAROEN OPTICAL

สายตา พัฒนา

ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2612-4170-1

www.topcharoen.com

50th

แว่นท็อปเจริญ

TOP CHAROEN OPTICAL

เฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี




ศูนย์รักษา
ต้อปเจริญ
TOP CHAROEN EYE CENTRE

"เราห่วงใยคุณ We care your eyes"

เว้นที่ข้อปฏิบัติ ผู้เยี่ยมชมด้านสายตาต่ำกว่า 50 ปี งดเม้า

"ศูนย์รักษา ที่จอเรตินากัญ"

จอเรตินาที่จอแก้ว ฟิล์มตา/จอเรตินา/จอประสาทตา/จอแก้ว/จอแก้ว/จอประสาทตา/จอแก้ว
จอประสาทตาจอประสาทตาจอประสาทตา/จอประสาทตาจอ/จอประสาทตาจอประสาทตา/จอประสาท
(ASK CENTER) เป็นจอประสาทตาจอเรตินากัญที่จอเรตินาจอประสาทตาจอประสาทตาจอประสาทตาจอประสาทตา
ศูนย์รักษา จอเรตินากัญ ศูนย์จอเรตินา จอเรตินากัญ 4 ในทามอสยส์
โทร. 0-2584-6664 www.tcec.co.th



Normal eye

สายตาผิดปกติ (Refractive Error)

สายตาสั้น : ตามักตั้งของเห็นชัดเจน ภาพที่มองเห็นจึงโฟกัสในจุดเล็กตรงตำแหน่งจุดรับภาพ ส่วนคนที่สายตาผิดปกติ ภาพที่มองเห็นจะไม่โฟกัสเป็นจุดเล็กที่จุดรับภาพ โดยทำโฟกัสหน้าจุดรับภาพเรียก สายตาสั้น (Myopia) ทำโฟกัสหลังจุดรับภาพเรียก สายตายาว (Hyperopia) ทำโฟกัสไม่เบี่ยงกลมเล็ก เรียก สายตาเอียง (Astigmatism) ปกติเด็กแรกเกิดลูกตามีขนาดเล็ก จึงเป็นสายตายาว แต่เด็กมีความสามารถในการมองพด้มมากขึ้น จึงไม่มีความสามารถในการมองเห็น ต่อมาอายุมากขึ้น ลูกตามขยายโตขึ้น สายตายาวจึงลดลงและมีแนวโน้มสายตาสั้น โดยเฉพาะ ทำผิดที่การใช้สายตาในลูกวัยหรือกรรมพันธุ์สายตาสั้น

สายตาสั้น (Myopia) คือ ภาวะมองใกล้ไม่ชัดจน แต่มองใกล้ชัด แบ่ง 2 กลุ่ม คือ สายตาสั้นไม่มาก ซึ่งพบในคนทั่วไป ส่วนอีกกลุ่มหนึ่ง คือ สายตาสั้นมาก มากกว่า 6.00 ไดออปเตอร์ อาจเกิดจากลูกตามีขนาดยาวขึ้น มีนัยหรืออาจพบการเสื่อมของรับภาพ หรืออาจเกิดขึ้น เนื่องจากจอตาบวมจากการยืดตัวของลูกตา

สายตายาว (Hyperopia) คือ ภาวะมองใกล้เลี้ยวไปชัดจน

สายตาเอียง (Astigmatism) คือ ภาวะที่มองเห็นภาพหนึ่งชัดแต่ภาพอีกภาพที่ต่างจากไม่ชัดจน

สายตายาวตามอายุ (Presbyopia) คือ ภาวะที่ตาไม่สามารถมองเห็นภาพระยะใกล้ที่ชัดได้ สาเหตุเนื่องจากกล้ามเนื้อตาในการเพ่งมองใกล้ หรือเลนส์ตายืดหยุ่นลดลง จนไม่สามารถโฟกัสภาพที่ระยะใกล้ที่ชัดจนได้

กรณีฉุกเฉิน : การใช้สายตาที่หักวงรีผิดปกติ ส่งผลอย่างเพียงพอระบบของตาและสุขภาพตาเป็นระยะ มีจุดบวมยังไม่หายขาดตาใสที่บ่งบอกว่าหรือของสุขภาพผิดปกติได้

กรณีปกติ : เว้นสายตาเป็นจุดที่ช่วยให้การมองเห็นดีขึ้น แต่เป็นวิธีลดอายุที่สุด การใส่แว่นให้มาสมกับสายตา โดยต้องวัดสายตา ส่วนการใส่แว่นตลอด หรือการใส่บางเวลา ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสายตา แต่แว่นทำให้สมองทำงานหนักขึ้น ไม่ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อในทางเสียในการที่สายตา ช่วงนี้ต้องใส่แว่นสายตาให้ร่างกายที่กับนิสัยการมองเห็นดีขึ้นโดยเฉพาะ กรณีสายตาผิดปกติสองข้างต่างกันมาก จนไม่สามารถใส่แว่นได้ ข้อเสีย ต้องดูเลขความสอาด และอาจพบตาแห้ง หรือแพ้สิ่งปลอมในคอนแทคเลนส์

การผ่าตัดเลเซอร์ที่ใช้สายตาเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง เพราะ การรักษารักษาส่วนที่หนาขึ้นที่ดวงตา สายตาควรต้องคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่ดีโรคตาที่บวมขึ้น มีความปลอดภัยสูงเมื่อเทียบความเสียหายของจอประสาทตา ทั้งแว่นแว่นสายตา

กรณีปกติด้วย : บุคคลที่มีสายตาเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว (> 1.00 D / ปี) มีอาการปวดตา หรือมีอาการตาบวมองไม่ชัด แม้ได้รับการแก้ไข โดยแว่นสายตาควรได้รับการตรวจวัดสายตาซ้ำโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสายตา แลควรตรวจตาอย่างละเอียด โดยจักษุแพทย์ตรวจสอบสุขภาพตา เพื่อตรวจหาโรคตาที่พบร่วมกับสายตาผิดปกติบ่อย เช่น ต้อหิน ต้อกระจก จอตาบวมแดง หลอดเลือดตาเสื่อมเร็ว

ศูนย์รักษา ที่จอเรตินากัญ เป็นศูนย์ตรวจและวินิจฉัยรักษารักษา และแก้ไขปัญหาสายตาทุกประเภท เช่น เว้นตา คอนแทคเลนส์ เลสิกการผ่าตัด เลสิก (LASIK) โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งมีเครื่องมือตรวจวัดสายตาที่แม่นยำ (TC-Check™) โดยไม่รับคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ วัดสายตาด้วยเลนส์ (Phoropter) เพื่อให้การวัดสายตาถูกต้องแม่นยำ รวมทั้งมีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำในการเลือกกรอบแว่น และเลนส์แว่นตาชนิดต่างๆ ที่เหมาะสมกับรายบุคคล